

3.2.2.a pielikums

Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānam 2022.-2027. gadam

Pārejas ūdensobjekta LVT un teritoriālo ūdeņu pseido ŪO LVG monitorings 2015.-2019. gadā

1. tabula. Jūras monitoringa staciju koordinātas Rīgas līča pārejas ūdeņu zonā

Stacijas nosaukums/kods	Dzījums	Ģeogrāfiskās koordinātas		Piederība upju baseinam
		Platums N	Garums E	
168	12	56°58.80'	23°44.60'	Lielupe
167B	21	57°03.30'	23°53.30'	
167	12	57°01.50'	23°55.20'	
165	12	57°05.00'	24°00.10'	Daugava
101A	22	57°06.00'	23°59.00'	
103	37	57°10.00'	23°56.00'	
163	12	57°10.10'	24°15.00'	Gauja
163B	21	57°11.00'	24°13.00'	

Fizikāli ķīmisko rādītāju monitorings

1) Temperatūras režīms

Temperatūras mērījumi fiksētajās Rīgas līča pārejas ūdeņu zonas stacijās ir veikti 1–4 reizes gadā (skat. 2.tabulu). Mērījumi ir veikti ar CTD zondi un paralēli ar pie batometriem piestiprinātiem jūras termometriem. Izmantojot rozetes tipa paraugu ņēmēju, paralēlie mērījumi ar termometriem nav veikti, jo nav nepieciešami. Temperatūras mērījumi ar CTD ir veikti vienlaicīgi ar pārējiem novērojumiem un paraugu ņemšanu ķīmiskajiem rādītājiem.

2) Sāluma režīms

Sāluma mērījumi fiksētajās Rīgas līča pārejas ūdeņu zonas stacijās ir veikti 1–4 reizes gadā (skat. 2.tabulu). Mērījumi ir veikti ar CTD zondi un paralēli, ar batometru ņemot sāluma analīzēm paredzētu paraugu, ko tālāk analizē laboratorijā ar jūras klases konduktometru. Rīgas līča pārejas ūdeņu zonas stacijās sāluma mērījumi ar CTD ir veikti vienlaicīgi ar pārējiem novērojumiem un paraugu ņemšanu ķīmiskajiem rādītājiem.

3) Izšķidušā skābekļa režīms

Skābekļa mērījumi fiksētajās Rīgas līča pārejas ūdeņu zonas stacijās ir veikti 1–4 reizes gadā (skat. 2.tabulu). Mērījumi ir veikti ar CTD zondi un paralēli, ar batometru ņemot skābekļa analīzēm paredzētu paraugu, ko tālāk analizē kuģa laboratorijā ar Vinklera titrimetrisko metodi. Izšķidušā skābekļa mērījumi ar CTD ir veikti vienlaicīgi ar pārējiem novērojumiem un paraugu ņemšanu ķīmiskajiem rādītājiem.

4) pH un duļķainības režīms

pH un duļķainības mērījumi fiksētajās Rīgas līča pārejas ūdeņu zonas stacijās ir veikti 1–4 reizes gadā (skat. 2.tabulu). pH mēra laboratorijā, ar pH-metru, izmantojot elektrometrisko metodi. Kā ūdens duļķainības (suspendēto daļiņu satura) raksturotāju izmanto parauga gaismas absorbciju gaismai ar vilņa garumu 750 nm. Papildus tam katru reizi veic ūdens caurspīdības mērījumus ar Seki disku. Rīgas līča pārejas ūdeņu zonas stacijās ūdens pH un duļķainības mērījumi ir veikti vienlaicīgi ar pārējiem novērojumiem un paraugu ņemšanu ķīmiskajiem rādītājiem.

2. tabula. Rīgas līča pārejas ūdeņu zonas monitoringa stacijās veiktie fizikāli ķīmisko rādītāju novērojumi

Stacijas kods	Apsekotie horizonti (m)	Apsekojumi veikti, reizes			
		Periodā kopumā	Gads	Skaits gadā	Sezonas
Noteiktie rādītāji: CTD profils (sālums, T, D₇₅₀), Seki dzījums, pH, izšķidušais skābeklis, DIN (N-NO₂, N-NO₃, N-NH₄), DIP (P-PO₄), DSi (Si-SiO₄), N_{kop.}, P_{kop.}					
168	0,5, 5, 10	14	2015	3	P, V, R
			2016	4	Z, P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	2	P, Z
167B	0,5, 5, 10, 15, 20	12	2015	3	P, V, R
			2016	3	P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	1	P
167	0,5, 5, 10	15	2015	3	P, V, R
			2016	4	Z, P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	3	P, V, R
			2019	2	V, Z
165	0,5, 5, 10	15	2015	3	P, V, R
			2016	4	Z, P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	3	P, V, R
101A	0,5, 5, 10, 15, 20	15	2015	3	P, V, R
			2016	4	Z, P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	3	P, V, R
103	0,5, 5, 10, 20, 30, 35	13	2015	3	P, V, R
			2016	4	Z, P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	1	P
163	0,5, 5, 10	15	2015	3	P, V, R
			2016	4	Z, P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	3	P, V, R
163B	0,5, 5, 10, 15, 20	12	2015	3	P, V, R
			2016	3	P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	1	P

5) Biogēnu koncentrāciju režīms

Biogēnu koncentrāciju mērījumi fiksētajās Rīgas līča pārejas ūdeņu zonas stacijās ir veikti 1–4 reizes gadā (skat. 2.tabulu). Ir noteikti sekojoši parametri:

- DIN (izšķidušā neorganiskā slāpekļa savienojumi – amonija slāpekļa, nitrātu slāpekļa, nitrītu slāpekļa summa);
- TN (kopējais slāpeklis);
- TP (kopējais fosfors);
- DIP (izšķidušais neorganiskais fosfors – fosfātu fosfors);
- DSi (izšķidušais silīcijs – silikātu silīcijs).

Šo parametru koncentrāciju noteikšanai izmanto Jūras ūdens analīžu standartmetodes (*Methods of Seawater Analysis. Ed. By K.Grasshoff, M.Ehrhardt, K.Kremling, Second, Revised and Extended Edition, Basel, Verlag Chemie, 1983*), kas ir modifētas saskaņā ar norādījumiem HELCOM COMBINE rokasgrāmatā:

- Nitrītu slāpeklīm – nitrītu jonu reakcija ar sulfanilamīdu (balto streptocīdu) un N-(1-naftil) etilēndiamīnu, pēc 15 minūtēm veidojot purpursārtu azokrāsvielu ar gaismas absorbčijas maksimumu pie 543 nm, kas ir stabila 1 stundu.
- Nitrātu slāpeklīm – nitrātu reducēšana līdz nitrītiem, izmantojot Cd-Cu reducētāju. Pēc reducēšanas nitrīti tiek analizēti saskaņā ar nitrītu analīzes metodi.
- Amonija slāpeklīm – amonija jonu reakcija ar dihloricocianūrkābes joniem, veidojot monohloramīnu, kas fenola un nitroprusīda jonu klātbūtnē istabas temperatūrā 6 stundu laikā veido indofenola zilo ar gaismas absorbčijas maksimumu pie 630 nm.
- Kopējam slāpeklīm – slāpekli saturošie organiskie savienojumi paraugā tiek sagrauti, oksidējot tos ar persulfātu paaugstinātā spiedienā un temperatūrā nātrijs hidroksīda un borskābes klātbūtnē. Pēc organisko savienojumu sagraušanas paraugā tiek noteikts summārais oksidēto slāpekļa savienojumu saturs, reducējot visus paraugā esošos nitrātus līdz nitrītiem un nosakot nitrītu koncentrāciju.
- Fosfātu fosforam – fosfāta jonu reakcija ar amonija molibdātu skābā vidē antimonitartrāta klātbūtnē, veidojot fosfomolibdēnheteropoliskābes un trīsvērtīgā antimona kompleksu, kas pēc tam tiek reducēts ar askorbīnskābi, iegūstot zili krāsotu savienojumu ar gaismas absorbčijas maksimumu pie viļņa garuma 885 nm.
- Kopējam fosforam – fosfororganiskie savienojumi tiek sagrauti līdz fosfātioniem, oksidējot tos ar persulfātu paaugstinātā spiedienā un temperatūrā nātrijs hidroksīda un borskābes klātbūtnē, un tālāk analizēti saskaņā ar fosfātjonu analīzes metodi.
- Silikātu silīcijam – silikāta jonu reakcija ar amonija molibdātu, veidojot dzeltenu kompleksu savienojumu – heteropoliskābi, kuru reducējot ar askorbīnskābi, iegūst zilu savienojumu ar gaismas absorbčijas maksimumu pie viļņa garuma 810 nm.

Hidrobioloģisko rādītāju monitorings

1) Hlorofila a koncentrāciju režīms

Hlorofila a koncentrācijas mērījumi fiksētajās Rīgas līča pārejas ūdeņu zonas stacijās ir veikti 1–4 reizes gadā (skat. 3.tabulu). Paraugu ņemšanu un hlorofila a saturu noteikšanu veic atbilstoši HELCOM metodikai. Paraugu ņemšanu hlorofila a noteikšanai veic, vertikāli iegremdējot noslēdzamu plastmasas cauruli virsējā 10 metru ūdens slānī; ūdens paraugu filtrē caur Whatman GF/C filtru un pēc tam nogulsnes ekstrahē no filtra ar etilspirtu. Hlorofila a saturu etilspirta ekstraktā nosaka spektrofotometriski.

3. tabula. Rīgas līča pārejas ūdeņu zonas monitoringa stacijās veiktie hlorofila a novērojumi

Stacijas kods	Apsekotie horizonti (m)	Apsekojumi veikti, reizes			
		Periodā kopumā	Gads	Skaits gadā	Sezonas
Noteiktie rādītāji: hlorofila α satus					
168	0–10	14	2015	3	P, V, R
			2016	4	Z, P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	2	P, Z
167B	0–10	12	2015	3	P, V, R
			2016	3	P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	1	P
167	0–10	14	2015	3	P, V, R
			2016	4	Z, P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	2	P, Z
165	0–10	14	2015	3	P, V, R
			2016	4	Z, P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	2	P, R
101A	0–10	13	2015	3	P, V, R
			2016	4	Z, P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	1	P
			2019	2	P, R
103	0–10	13	2015	3	P, V, R
			2016	4	Z, P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	1	P
163	0–10	14	2015	3	P, V, R
			2016	4	Z, P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	2	P, R
163B	0–10	12	2015	3	P, V, R
			2016	3	P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	1	P

2) Fitoplanktona sugu sastāvs, sezonālā un ģeogrāfiskā dinamika

Paraugu ņemšana fitoplanktona rādītāju noteikšanai fiksētajās Rīgas līča pārejas ūdeņu zonas stacijās ir veikta 1–4 reizes gadā (skat. 4.tabulu). 168., 167B, un 103. stacijā pārskata periodā fitoplanktona paraugi nav ņemti, bet 163B stacijā tie ir ņemti tikai vienreiz.

Fitoplanktona sugu sastāva, sezonālās un ģeogrāfiskās dinamikas noteikšanai izmanto integrēto paraugu no virsējā 10 metru slāņa, atbilstoši HELCOM COMBINE rokasgrāmatā noteiktajai metodikai paraugu ņemot ar noslēdzamu plastmasas cauruli. Fiksētu paraugu iepilda sedimentācijas kamerā, organismu skaitīšanu un izmēru noteikšanu veic, izmantojot invertēto mikroskopu. Biomasu aprēķina, izmantojot īpašu skaitīšanas programmu.

4. tabula. Rīgas līča pārejas ūdeņu zonas monitoringa stacijās veiktie fitoplanktona novērojumi

Stacijas kods	Apsekotie horizonti (m)	Apsekojumi veikti, reizes			
		Periodā kopumā	Gads	Skaits gadā	Sezonas
Noteiktie rādītāji: fitoplanktona sugu sastāvs un biomasa					
168	0–10	0	2015–2019	0	—
167B	0–10	0	2015–2019	0	—
167	0–10	13	2015	3	P, V, R
			2016	3	P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	2	P, Z
165	0–10	15	2015	3	P, V, R
			2016	4	Z, P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	3	P, V, R
101A	0–10	15	2015	3	P, V, R
			2016	4	Z, P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	3	P, V, R
103	0–10	0	2015–2019	0	—
163	0–10	14	2015	3	P, V, R
			2016	3	P, V, R
			2017	3	P, V, R
			2018	2	P, V
			2019	3	P, V, R
163B	0–10	1	2015	0	—
			2016	0	—
			2017	0	—
			2018	1	V
			2019	0	—

3) Zoobentosa sugu sastāvs, sezonālā un ģeogrāfiskā dinamika, bentiskās kvalitātes indekss BQI

Mīksto grunšu zoobentosa apsekojumi ir veikti vienu reizi gadā maijā, katru gadu, apsekojot reprezentatīvas stacijas (skat. 1.tabulu). Katrā stacijā ar Van Veen tipa kausu (atvērums 1000 cm², HELCOM standarts) nēm trīs paralēlos paraugus, kuros laboratorijā nosaka sugu sastāvu, īpatņu skaitu un biomasu. Informāciju par pārskata periodā veiktajiem apsekojumiem skat. 5.tabulā. Novērojumi nav veikti 103. stacijā.

Cieto grunšu zoobentosa apsekojumi ūdensobjektā LVT nav veikti.

4) Makrofitu sugu sastāvs un izplatība uz cieto grunšu substrāta

Makrofitu sugu sastāva un izplatības uz cieto grunšu substrāta apsekojumi ūdensobjektā LVT nav veikti.

5. tabula. Rīgas līča pārejas ūdeņu monitoringa stacijās veiktie mīksto grunšu zoobentosa novērojumi

Stacijas kods	Stacijas dzījums, m	Apsekojumi veikti – kad, cik reizes	
		Periodā kopumā	Gadi
Noteiktie rādītāji: zoobentosa sugu sastāvs un biomasa			
101A	22	5	2015, 2016, 2017, 2018, 2019
103	37	0	–
163	12	5	2015, 2016, 2017, 2018, 2019
163B	21	5	2015, 2016, 2017, 2018, 2019
165	12	5	2015, 2016, 2017, 2018, 2019
167	12	5	2015, 2016, 2017, 2018, 2019
167B	21	5	2015, 2016, 2017, 2018, 2019
168	12	5	2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Prioritāro vielu monitorings (ietver piekrastes, pārejas un teritoriālos ūdeņus)

6. tabula. Prioritāro vielu apsekojuma rajoni/stacijas pārejas ūdensobjektā LVT un teritoriālo ūdeņu pseido ūdensobjektā LVG

Stacija/rajons	Ūdens baseins	Apsekojuma objekts (matrica)
Daugavgrīva	LVT	Asaris <i>Perca fluviatilis</i>
Rīgas līcis (119. stacijas rajons)	LVCDE; LVF; LVT, LVG	Renģe <i>Clupea harengus</i>
119.	LVCDE; LVF; LVT, LVG	Ūdens